

Tumeurs de la vessie



Préparer ce cas clinique en utilisant le nouveau vocabulaire.

VOUS NE POUVEZ PAS EMPLOYER les mots en rouge

MdH homme de 69 ans hospitalisé parce qu'il a eu deux fois des urines rouges pendant le dernier mois suivi par le Dr Legengre 12 place de la Victoire 33000 Bordeaux (/marié/2enfants).

Histoire de la maladie : Reconstituer l'histoire récente de la maladie.

Pollakiurie uniquement dans la journée (arrive sans prévenir) depuis un mois
Il doit parfois pousser pour uriner surtout lorsqu'il s'est retenu longtemps dp un mois
Il ressent depuis 3 semaines une brûlure mictionnelle qui s'aggrave
N'a pas consulté (était en Egypte)

à ne donner que si questions posées

Interrogatoire :

Antécédents (ATCD)

• Personnels médicaux :

Maladies d'enfance habituelles

maladies : Il a eu la grippe il y a 10 ans

Ø diabète Ø HTA Ø allergies Ø retard dans les vaccins Ø transfusion

• Personnels chirurgicaux et accidents. AP

Op ablation d'un kyste sacro-coccygien à l'âge de 21 ans

Une appendicectomie dans l'enfance (12 ans)

Un remplacement valvulaire aortique (à 62 ans) raison tté par 1 cp 1/2 par jour (Previscan®)

• Familiaux : ascendants, descendants et collatéraux. AF

AF : père DCD d'un IDM à 55 ans, mère morte d'un cancer des poumons il y a 2 ans pas de maladies pour les collatéraux et descendant

Exposition aux risques :

• Mode de vie (MdV)

nutrition : mange bien => cholestérol tté par Lipirex dp 6 ans

tabac : 2 pq/jour dp l'âge de 18 ans

Ø alcool (-OH), Ø drogue sexualité RAS

activités physiques marche environ 20 minutes par jour.

• Professionnels. A la retraite depuis 9 ans ouvrier pendant 40 ans dans une usine qui fabriquait des colorants synthétiques

• Voyages récents. revient d'un voyage d'un mois en Egypte.

Traitement en cours et chronique (ttt)

Médicament. Traitement en cours et chronique, en particulier bêtabloquants, anti-coagulants, antidiabétiques oraux.

Previscan anticoagulant dp 6 ans

Lipirex (fénofibrate) dp 4 ans