

Préparer ce cas clinique en utilisant le nouveau vocabulaire.
VOUS NE POUVEZ PAS EMPLOYER les mots en rouge

Ulcère Gastrite maladies de l'estomac

Motif d'hospitalisation (MdH): ou SYMPTÔMES DOMINANTS QUI ONT MOTIVÉ L'ENTRÉE

Femme de 65 ans, hospitalisé(e) pour **hématomèse** – trois fois en 24h-, suivie par le Dr Legengre 12 place de la Victoire 33000 Bordeaux (mariée/3 enfants).

Histoire de la maladie : Mme X est hospitalisée aux Urgences via les pompiers pour une **hématomèse** survenue à 3 épisodes depuis 24h. Cette patiente de 65 ans s'est traitée toute seule récemment pour des douleurs du genou par du **VOLTARENE®** (anti inflammatoire) prescrit à son mari. Elle a fait des **selles malodorantes** la veille. Elle présente une douleur épigastrique.

ATTENTION à bien préciser:

- 1) topographie douleur à l'estomac
 - 2) histoire douleur qui a **commencé il y a une demi heure** jamais ressenti avant
 - 3) type **crampe d'estomac ++**
 - 4) intensité et conséquences sur la qualité de la vie : **inquiète par les vomissements du sang** peur du cancer
- Øfacteurs aggravants/soulageant :
- 6) signes associés de gastro :
- selles pâteuses et malodorantes dp 12h** Øchgt de couleur des selles Ømelanea Ørectorragies
Ødlr abdominales Øballonnement
hématomèse: **quantité évaluée à un mug**, Øpâleur, Ødyspnée, Øsoif, état de conscience : e.o
Øde gout de sang Øde dentifrice rouge Øtoux Ø
Ødiarrhée ou constipation
Øpb d'oesophage

Interrogatoire :

Antécédents (ATCD)

• Personnels médicaux :

maladies **phlébite** il y a 2 mois et **thyroïdite dp 2ans** tté
Ødiabète Øhypertension Øallergies Øtransfusion
vaccins e.o
atcd gynéco-obstétriques RAS

• Personnels chirurgicaux et accidents. AP

fracture du tibia il y a 2 mois et demi d'où **plâtre** d'où la **phlébite** tté

•ØFamiliaux : ascendants, descendants et collatéraux. **AF**

Exposition aux risques :

• Mode de vie (MdV) :

nutrition : RAS
tabac : **3cg/sem.**
Øalcool (-OH) Ødrogue Øactivités physiques
sexualité : RAS

• Professionnels.

RAS retraitée – ancienne secrétaire

ØVoyages récents.

• Traitement en cours et chronique (ttt)

Médicament. Traitement en cours et chronique, en particulier bêtabloquants, anti-coagulants, antidiabétiques oraux.
Préviscan, Levothyrox (dernière TSH il y a 15 jours normale) + **Voltarène**
Hémorragie digestive haute probablement par ulcère favorisée par une prise d'anti-inflammatoire et un surdosage en AVK.